

Avdeling for ingeniørutdanning

Eksamens i Matematikk Ny og utsatt prøve

Dato: 3. August 2009

Tid: 09.00 – 14.00


Antall sider inklusive forside: 3 + vedlegg

Antall oppgaver: 5

Tillatte hjelpeemidler: Godkjent kalkulator

Merknad: Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.
Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de
forutsetninger du legger til grunn for løsningen.

Faglig veileder: Eivind Eriksen, Halvard Fausk

Utarbeidet av (faglærer):	Kontrollert av (en av disse):			Studieleders/ Fagkoordinatørs underskrift:
	Annen lærer	Sensor	Studieleder/ Fagkoordinator	
Eivind Eriksen Halvard Fausk	Halvard Fausk Eivind Eriksen			

Emnekode: FO 929A

Eksamens i	FO929A Matematikk
	Kontinuasjonseksemseten
Dato	August 2009
Tidspunkt	09.00 - 14.00
Antall oppgaver	5
Vedlegg	Formelsamling
Tillatte hjelpeemidler	Godkjent kalkulator

Oppgave 1

Deriver følgende funksjoner:

- a) $f(x) = 1 + 2x + 3x^2$
- b) $f(x) = \frac{3}{x} + \frac{7}{\sqrt[3]{x}} - x^9 \sqrt{x}$
- c) $f(x) = \frac{-2}{\ln|3x|}$
- d) $f(x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(x)}$
- e) $f(x) = \cos(3x) e^{-x/5}$
- f) $f(x) = \sin(\sin(x+1))$

Oppgave 2

La $Q = (2, 3, 1)$, $R = (3, 1, 2)$ og $S = (1, 2, 3)$ være tre punkter i rommet.

- a) Forklar at det er akkurat ett plan p som går gjennom origo $O = (0, 0, 0)$ og punktene Q og R . Forklar hvorfor vektoren fra origo til et vilkårlig punkt W i planet p kan skrives som $\vec{OW} = s\vec{OQ} + t\vec{OR}$ for reelle tall s og t .
- b) Finn et punkt W i planet p slik at \vec{OW} står normalt på \vec{OQ} .
- c) Finn en vektor som står normalt på planet p .
- d) Finn punktet i planet p som ligger nærmest punktet S .

Oppgave 3

Regn ut følgende ubestemte integraler:

- a) $\int (2x^{-3} - x^{-1} + 3\sqrt{x}) dx$
- b) $\int 2 \cos(-4x + 5) dx$
- c) $\int \frac{2}{x^2 - 4} dx$
- d) $\int \frac{\ln x}{x} dx$

Oppgave 4

- a) Bestem arealet av regionen avgrenset av grafen til $y = x$ og grafen til $y = x^2$.
- b) Bestem volumet til rotasjonslegemet som fremkommer ved å rotere området begrenset av x -aksen, grafen til

$$h(x) = \sqrt{x}e^{x^2}$$

og linjene $x = 1$ til $x = 3$ omkring x -aksen.

- c) Finn funksjonen $f(x)$ slik at den tilfredstiller differensielllikningen

$$f'(x)f(x) = x$$

og initialbetingelsen $f(1) = -2$.

- d) Finn alle løsningene til differensielllikningen

$$y'x^2(x+1) = y$$

- e) Finn det bestemte integralet

$$\int_{-2}^2 \sin(x^3) dx$$

Oppgave 5

Vi ser på funksjonen $g(x) = 5\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^5}$ definert på området $D_g = [-6, 2]$.

- a) Finn eventuelle nullpunkter for $g(x)$ ved regning. Finn eventuelle asymptoter for $g(x)$.
- b) Finn $g'(x)$ og $g''(x)$.
- c) Finn koordinatene til alle lokale toppunkt for g . Har g globale toppunkt?
- d) Finn koordinatene til alle lokale bunnpunkt for g . Har g globale bunnpunkt?
- e) Finn alle vendepunkter for g .
- f) Skisser grafen til g .

FORMELSAMLING FOR MATEMATIKK FORKURS

1. ALGEBRA

1.1. Kvadratsetningene.

- a) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 b) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 c) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

1.2. Løsning av andregradslikningen.

- a) Løsning av likningen $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1.3. Potenser med fast grunntall.

- a) $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$
 b) $a^p/a^q = a^{p-q}$
 c) $(a^p)^q = a^{p \cdot q}$

1.4. Potenser med fast eksponent.

- a) $a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p$
 b) $a^p/b^p = (a/b)^p$

1.5. Potenser som røtter.

- a) $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$

2. REKKER

2.1. Aritmetiske rekker.

- a) $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
 b) $S_n = n \cdot (a_1 + a_n)/2$

2.2. Geometriske rekker.

- a) $a_n = a_1 \cdot k^{n-1}$
 b) $S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$
 c) $S = \frac{a_1}{1-k}$ for $|k| < 1$

3. TRIGONOMETRI

3.1. Identiteter.

- a) $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$
 b) $\tan u = \frac{\sin u}{\cos u}$
 c) $\sin(-u) = -\sin u$
 d) $\cos(-u) = \cos u$
 e) $\sin(180^\circ - u) = \sin u$
 f) $\cos(180^\circ - u) = -\cos u$

3.2. Addisjonsformler.

- a) $\sin(u \pm v) = \sin u \cdot \cos v \pm \cos u \cdot \sin v$
 b) $\cos(u \pm v) = \cos u \cdot \cos v \mp \sin u \cdot \sin v$
 c) $\tan(u \pm v) = \frac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \cdot \tan v}$
 d) $\sin(2u) = 2 \sin u \cdot \cos u$
 e) $\cos(2u) = \cos^2 u - \sin^2 u$
 f) $\tan(2u) = \frac{2 \tan u}{1 - \tan^2 u}$

3.3. Eksakte verdier for noen vinkler.

a)

u	u (rad)	$\sin u$	$\cos u$	$\tan u$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	-

3.4. Harmoniske svingninger.

- a) $f(t) = A \sin(\omega(t - \phi)) + c$
 b) $T = 2\pi/\omega$

4. GEOMETRI

4.1. Rette linjer.

- a) Likning: $y = ax + b$
 b) $y - y_0 = a \cdot (x - x_0)$

4.2. Trekanter.

- a) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
 b) $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$
 c) Areal trekant: $\frac{1}{2} bc \cdot \sin A$

4.3. Sirkler.

- a) Likning: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$
 b) Areal sirkel: $A = \pi r^2$
 c) Omkrets sirkel: $O = 2\pi r$
 d) Areal sirkelsektor: $A = 1/2 r^2 v$
 e) Buelengde sirkelsektor: $b = r v$

4.4. Volum og overflate.

- a) Volum prisme/sylinder: $V = G h$
 b) Volum pyramide/kjegle: $V = 1/3 G h$
 c) Volum kule: $V = 4/3 \pi r^3$
 d) Overflate kule: $O = 4\pi r^2$

5. VEKTORER

5.1. Skalarprodukt.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\alpha)$

5.2. Vektorer i planet.

- a) $(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$
 b) $c \cdot (x, y) = (cx, cy)$
 c) $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2$
 d) $|(x, y)| = \sqrt{x^2 + y^2}$

5.3. Vektorer i rommet.

- a) $(x_1, y_1, z_1) \pm (x_2, y_2, z_2)$
 $= (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$
- b) $c \cdot (x, y, z) = (cx, cy, cz)$
- c) $(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2)$
 $= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- d) $|(x, y, z)| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- e) $(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$
 $= (y_1z_2 - y_2z_1, x_2z_1 - x_1z_2, x_1y_2 - x_2y_1)$

6. LOGARITMER**6.1. Naturlige logaritmer:**

- a) $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$
- b) $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
- c) $\ln(a^p) = p \cdot \ln a$

6.2. Logaritmer med andre grunntall.

- a) $\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$

7. DERIVASJON**7.1. Derivasjonsregler:**

- a) $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- b) $(c \cdot u)' = c \cdot u'$ for c konstant
- c) Produkt: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
- d) Kvotient: $(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$
- e) Kjerneregelen: $(f(u))' = f'(u) \cdot u'$

7.2. Den deriverte til noen funksjoner:

- a) $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- b) $(\sin x)' = \cos x$
- c) $(\cos x)' = -\sin x$
- d) $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$
- e) $(e^x)' = e^x$
- f) $(\ln x)' = 1/x$

8. INTEGRASJON**8.1. Integrasjonsregler:**

- a) $\int (u \pm v) dx = \int u dx \pm \int v dx$
- b) $\int c \cdot u dx = c \cdot \int u dx$ for c konstant
- c) Delvis integrasjon:

$$\int u' \cdot v dx = u \cdot v - \int u \cdot v' dx$$

- d) Substitusjon:

$$\int f(u) \cdot u' dx = \int f(u) du$$

8.2. Integralet av noen funksjoner:

- a) $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ for $n \neq -1$
- b) $\int 1/x dx = \ln |x| + C$
- c) $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- d) $\int \cos x dx = \sin x + C$
- e) $\int (\tan^2 x + 1) dx = \tan x + C$
- f) $\int e^x dx = e^x + C$